

# OPALE

**AVOINE BRODIFACOUM 25PPM**  
RATS BRUNS, RATS NOIRS & SOURIS  
BRODIFACOUM 0,0025%

## Présentation du produit

Type de produit	TP14 – Rodenticide
Type de formulation	Appât en grain, prêt à l'emploi (RB)
Substance active	Brodifacoum N°CAS 56073-10-0
Concentration	0,0025% m/m
Amérisant	Benzoate de denatonium 10ppm

## Informations réglementaires

Nom homologué	GRAIN BRODIF 25
N° d'AMM	FR-2015-0055 - Professionnels de la lutte contre les rongeurs
Organismes ciblés	Rats bruns ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Rats noirs ( <i>Rattus rattus</i> ) Souris domestiques ( <i>Mus musculus</i> )
Application	Utilisation en intérieur, autour des bâtiment / en zones ouvertes extérieures, décharge et déchetteries (rats uniquement).

## Mode d'action

Le Brodifacoum est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes quelques jours après ingestion de l'appât.

## Conditions et doses d'emploi

Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage ou des points d'appâts couverts et protégés.

### Utilisation en intérieur, autour des bâtiments, en zones ouvertes :

Contre les rats : 50 g de produit espacés de 5 à 10 mètres.  
Contre les souris : 25 g de produit espacés de 2 à 5 mètres.

### Utilisation dans les décharges extérieures et déchetteries :

Contre les rats : 50 g de produit espacés de 5 à 10 mètres.

Inspecter les postes après 2 à 3 jours (souris) et 5 à 7 jours (rats) pour vérifier que l'appât est accepté, puis une fois par semaine. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

NE PAS utiliser en APPÂTAGE PERMANENT.



## Référence et conditionnement

**Réf. R9008** : Sachets de 25g - Seau de 5kg (Unité)

## Élimination

Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

## Précautions particulières

Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active. Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance.

Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause. Vous avez peut être affaire à des rongeurs résistants.

Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr

Les postes d'appâtage contenant **OPALE - AVOINE BRODIFACOUM 25PPM** doivent être étiquetés avec les informations suivantes :

Nom du produit :	
<input type="text"/>	
<b>Substance active :</b>	Ne pas déplacer, ni ouvrir.
Difénacoum	<input type="checkbox"/> Contient un rodenticide.
Bromadiolone	<input type="checkbox"/> Antidote : Vitamine K1
Brodifacoum	<input type="checkbox"/> En cas d'incident, contacter un centre antipoison.
Autre	N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59
<input type="text"/>	